

ថ្នាំគ្រួសារសាយធម្មតាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្មេងក្រោមអាយុ 2 ឆ្នាំ

Cold Meds Not Safe for Kids Under 2, FDA Warns

WUML

1/20/08

ក្រសួងរដ្ឋបាលនៃសហរដ្ឋ ទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកម្ហូបអាហារនិងថ្នាំសង្កូវ, U.S. Food and Drug Administration ឬ ក្រសួង FDA បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី17 ខែមករា កន្លងមកនេះថា សាធារណៈជន គួរកុំឲ្យក្មេងកំពុងធ្វើថ្នាំគ្រួសារសាយ ដែលទិញដោយពុំបាច់មាន សំបុត្រពិគ្រោះពេទ្យ ដល់ក្មេងដែលមានអាយុតិចជាង 2 ឆ្នាំឲ្យសោះ។

ទោះបីជាមានការផ្សាយដំណឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ ក្នុងការប្រើថ្នាំសំរាប់ក្មេងតូចៗ ក្នុងពេលថ្មីនេះ យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ក្រសួង FDA នៅតែប្រកាសថា សាធារណៈជននៅតែពុំបានចាប់អារម្មណ៍ ពីបញ្ហានេះ ដដែល។

វេជ្ជបណ្ឌិត Charles Ganley នាយក នៃក្រសួង FDA ការិយាល័យផ្នែក ថ្នាំទិញដោយពុំបាច់ មានសំបុត្រពិគ្រោះពេទ្យ មានប្រសាសន៍ នៅពេលផ្សាយដំណឹងនេះថា មាតាបិតាពុំគួរឲ្យក្មេង កំពុងធ្វើថ្នាំគ្រួសារសាយ ដល់ក្មេងដែលមានអាយុតិចជាង 2 ឆ្នាំនោះឡើយ។ ពីព្រោះ ថ្នាំទាំងនេះ អាចបណ្តាលឲ្យមានជាផលរិបគ្គិ ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត ដល់ក្មេងទាំងនោះបាន។ ការិយាល័យ របស់លោក នៅពុំទាន់សំរេច ចេញបញ្ជាឲ្យក្មេងអាយុពី 2 ឆ្នាំ ទៅ 11 ឆ្នាំលេបថ្នាំទាំងនេះនៅ ឡើយទេ។ លោកកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយការិយាល័យដទៃត្រូវរបស់ក្រសួង FDA ដើម្បីធ្វើការសំរេចចិត្តនេះ។

អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Catherine Tom-Rezon អ្នកចាត់ការនៅឧស្សាហកម្ម នៃមន្ទីរពេទ្យ កុមារ Montefiore Medical Center នៅទីក្រុង នូវយ៉ក មានប្រសាសន៍ថា ការផ្សាយដំណឹងពី ក្រសួង FDA ជាការមួយយ៉ាងល្អ។ គ្រូពេទ្យជាច្រើន ព្រមទាំងអ្នកស្រីផង តែងតែជឿសំរាប់ ពុំសរសេរសំបុត្រទិញថ្នាំសំរាប់ក្មេងតូចៗ ប្រើឡើយ នៅពេលគាត់ពុំទាន់មានសេចក្តី បញ្ជាក់ពី ការស្រាវជ្រាវណាមួយ ឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះឡើយ។

កាលពីខែ វិច្ឆិកាកន្លងមកនេះ ក្រសួង FDA បានទទួលលទ្ធផលពីការស្ទង់មតិមួយចំនួន ដែល គួរឲ្យបារម្ភថា មាតាបិតានៅតែឲ្យក្មេងទាំងនោះទៅកូនរបស់ខ្លួនលេប ដោយពុំមានការពិភាក្សា ជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់កូនឡើយ។

ថ្នាំគ្រួសារផ្តាសាយនិងថ្នាំក្អកទាំងនេះ មានទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់ក្មេងតូចៗ ដោយ រួមទាំង ការប្រកាច់ ដោយសារការក្តៅខ្លាំងពេក (Convulsion), ធ្វើឲ្យបេះដូងដើរញាប់ខុស ធម្មតា, ក្មេងបាត់ស្មារតីពុំដឹងខ្លួន និងរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ក៏មាន។

សំណុំរឿងដែលបានរាយការណ៍ទៅ ក្រសួង FDA នៅចន្លោះពីឆ្នាំ 1969 ដល់ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2006 បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា មានក្មេងចំនួន 54 នាក់ស្លាប់ដោយសារបញ្ហាសុខភាពទាក់ទងនឹង ថ្នាំគ្រួសារផ្តាសាយដែលធ្វើជាជាតិ pseudoephedrine, phenylephrine, ឬ ephedrine។ ជាមួយ គ្នានេះ មានក្មេងចំនួន 69 នាក់ទៀត ស្លាប់ ដោយសារបញ្ហាសុខភាពទាក់ទងទៅនឹងថ្នាំ ក្អក ដែលមានជាតិ diphenhydramine, brompheniramine, ឬ chlorpheniramine។ ក្មេងដែល ស្លាប់ទាំងនោះ ភាគច្រើន មានអាយុតិចជាង 2 ឆ្នាំ។

សេចក្តីប្រកាសនេះ គឺពឹងផ្អែកទៅលើការពិនិត្យទិន្នន័យ (data) នៃក្រសួង FDA និងការ ពិភាក្សាក្នុងអង្គប្រជុំរវាង ក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកថ្នាំទិញដោយពុំបាច់មានបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យ (Nonprescription Drug) និងពេទ្យកុមារ កាលពីខែ តុលាកន្លងមកនេះ។

មុនពេលប្រជុំនេះ ក្រុមហ៊ុនធ្វើថ្នាំគ្រួសារផ្តាសាយនិងថ្នាំក្អកដែលសំរាប់ឲ្យក្មេងតូចៗប្រើ បានស្ម័គ្រចិត្ត ប្រមូលថ្នាំទាំងនោះទុកវិញ។ ជាពិសេស គឺ ថ្នាំដែលមានដាក់រូបក្មេង តូចៗនៅលើដប និងថ្នាំដែលមានដាក់អក្សរថាសំរាប់ក្មេងតូចៗប្រើ។ ជាទូទៅ នៅសហរដ្ឋ មានលក់ថ្នាំគ្រួសារផ្តាសាយឬថ្នាំក្អកចំនួនប្រហែលជា 800 មុខ។ អ្នកជំនាញការបានប៉ាន់ស្មានថា ប្រជាជនក្នុងសហរដ្ឋបាន ចំណាយប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ ចំនួន 2 រយកោដិ ឬ 2 Billion dollar សំរាប់ទិញថ្នាំប្រភេទនេះ ក្នុងមួយឆ្នាំ។

អ្នកស្រី Lisa Mathis នាយករងនៃ ក្រសួង FDA ការិយាល័យផ្នែកឧសថចេញថ្មីៗ, ពេទ្យ កុមារ, និងសុខភាពម្តាយ បានផ្តល់យោបល់ដល់អ្នកដែលមានកូនអាយុតិចជាង 2 ឆ្នាំ ថា៖

- គួរចាំជានិច្ចថា ថ្នាំទាំងនេះពុំអាចព្យាបាលរោគគ្រួសារផ្តាសាយ ឲ្យបានដាច់ជាស្រឡះនោះ ឡើយ គឺវាគ្រាន់តែជួយបំបាត់អាការៈដែលបណ្តាលមកពីរោគគ្រួសារផ្តាសាយនោះ ប៉ុណ្ណោះ។
- ប្រសិនបើលោកអ្នកសំរេចឲ្យកូនលេប សូមអានបញ្ជីគ្រឿងឬជាតិថ្នាំ ដែលមាននៅ លើផ្តាវរបស់ដបថ្នាំទាំងនោះ ដើម្បីឲ្យដឹងថា តើគ្រឿងទាំងនោះជួយអ្វីខ្លះ។
- សូមប្រយ័ត្ន ឲ្យមែនទែន នៅពេលណាឲ្យថ្នាំគ្រួសារផ្តាសាយ ឬថ្នាំក្អក ដែលទិញដោយ ពុំបាច់មានសំបុត្រពីគ្រូពេទ្យ, Over the Counter, កូនពីរមុខលាយគ្នា។ សូមមេត្តាចាំថា

ថ្នាំទាំងនេះ អាចមានគ្រឿងច្រើនក្នុងនោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកឲ្យថ្នាំកូនពីរមុខ លាយ  
គ្នា វាអាចមានកម្លាំងខ្លាំង ហួសកំរិតសំរាប់កូនតូច។

- សូមឲ្យកូនលេបទៅតាមសេចក្តីណែនាំនៅលើដកនោះ។
- សូមប្រើតែប្រដាប់បន្តក់ ឬពែងដែលមានជាប់មកជាមួយនឹងដបថ្នាំទាំងនេះ គឺកុំយក  
ប្រដាប់វាល់ផ្សេងៗ ដែលមាននៅក្នុងផ្ទះស្រាប់ ទៅប្រើឲ្យសោះ។
- ប្រសិនបើលោកអ្នក អាចប្រើដបថ្នាំដែលមានប្រដាប់កាពារ ដើម្បីកុំឲ្យក្មេងបើកគម្រប  
ខ្លួនឯងបាននោះ វាជាការប្រសើរ។
- សូមដាក់ដបថ្នាំ ឲ្យខ្ពស់ឆ្ងាយពីដៃក្មេង។
- សូមពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ, អ្នកលក់ថ្នាំ, ឬបុគ្គលិកសុខាភិបាល ប្រសិនបើ លោកអ្នក  
មានសំណួរអ្វីផ្សេងៗ អំពីវិធីប្រើថ្នាំដែលត្រូវឲ្យកូនអាយុក្រោម 2 ឆ្នាំលេប។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមស្តីអំពីការប្រើថ្នាំគ្រួសារសាយនិងថ្នាំក្អកសំរាប់ក្មេងអាយុក្រោម 2ឆ្នាំ  
សូមមេត្តាអានវិស័យរបស់ ក្រសួងរដ្ឋបាលសហរដ្ឋទទួលបន្ទុកផ្នែកខាងម្ហូបអាហារនិងថ្នាំសង្កូវ,  
U.S. Food and Drug Administration ដែលមានអាសយដ្ឋាន [www.fda.gov](http://www.fda.gov) .

Soutrice: [www.healthfinder.gov](http://www.healthfinder.gov)