

តើលោកអ្នកអាចមានការកកឈាមក្នុងសរសៃឬ?

Are You At Risk for Deep Vein Thrombosis?

WUML

3/16/08

ការមានឈាមកកកក្នុងសរសៃដែលពាក្យអង់គ្លេសហៅថា Deep Vein Thrombosis ឬ DVT ជាបញ្ហាសុខភាពម្យ៉ាង ដែលច្រើនធ្វើឲ្យយើងពុំអាចដឹងបានជាមុន តែវាអាចការពារបាន។ បញ្ហា នេះ ច្រើនកើតឡើង នៅពេលដែលមានឈាមកកជាដុំនៅក្នុងសរសៃឈាម។

ក្នុងមួយឆ្នាំ មានប្រជាជនក្នុងសហរដ្ឋចំនួន ប្រហែលជាពី 3 ម៉ឺន ទៅ 6 ម៉ឺននាក់ ដែលបាន ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ដោយសារមានឈាមកកកក្នុងសរសៃឈាម បែកចេញជាបំណែកតូចៗ ហើយរត់តាមសរសៃឈាមនោះ ទៅក្នុងស្បូតបណ្តាលឲ្យស្លាប់។

មនុស្សយើងសឹងគ្រប់គ្នាមានបញ្ហាកកឈាមក្នុងសរសៃ។ ប៉ុន្តែ មានកត្តាខ្លះៗទៀត ដែលអាច បណ្តាល ឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ។ កត្តាដែលអាចបណ្តាលឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែ មានច្រើនថែមទៀតគឺ៖

- ការវះកាត់
- ការនៅស្ងៀមមួយកន្លែង ដោយធ្វើអ្វីពុំកើត ដូចជាការទទួលទានដំណេកស្ងៀម នៅក្នុង មន្ទីរពេទ្យ ឬការអង្គុយស្ងៀមក្នុងយន្តហោះយូរពេក
- ការទទួលគ្រោះថ្នាក់ មានរបួសនៅលើកន្លែងណាមួយ ក្នុងពេលថ្មីៗ
- ការមានជាតិ Estrogen ច្រើនពេក ដោយសារលេបថ្នាំពន្យារកំណើត, មានផ្ទៃពោះ, ឬ លេបថ្នាំពេទ្យអ្វីម្យ៉ាង
- ការមានជម្ងឺរាវជម្ងឺមួយ ដូចជា ជម្ងឺបេះដូង, ឬជម្ងឺមហារីក
- ការធ្លាប់មានកកឈាមក្នុងសរសៃពីមុន
- ការមានវ័យកាន់តែចាស់ជរា
- ការមានមាឌធំហួសកំរិត, និង
- ការទទួលទានបារី

កត្តាប្រាំយ៉ាង ដែរលោកអ្នកអាចការពារ កុំឲ្យមានការឈាមកកកក្នុងសរសៃឈាម បាន គឺ៖

1. ឧស្សាហ៍ធ្វើចលនា កំរើករាងកាយឲ្យបានរាប់ បន្ទាប់ពីបានដេកនៅលើគ្រែ យូរពេក បន្ទាប់ពីទទួលបានការវះកាត់, ការមានជម្ងឺ, ការមានរបួសអ្វីមួយ។
2. ពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ ថា តើលោកអ្នកគួរពាក់ស្រោមជើង ដែលហៅថា Medical Compression Stocking ដែរឬទេ។

3. នៅពេលណាដែលត្រូវអង្គុយយូរពេក ដូចជា នៅពេលធ្វើដំណើរក្នុងរថយន្ត ឬយន្តហោះ លើសពី 2 ម៉ោងឡើងទៅ៖ គួរងើបដើរចុះឡើងក្នុងរយៈពេល 2 ឬ 3 ម៉ោងម្តង, ហាត់ពត់ ជើងចុះឡើងឲ្យយឺតសរសៃ។ នៅពេលអង្គុយ សូមចុចចុងម្រាមជើងនៅលើក្តារ ចង្កើតកែង ជើងចុះឡើង, បន្ទាប់មកដាក់កែងជើងជាប់នឹងក្តារ ហើយកំរើកម្រាមជើងចុះឡើងម្តង។ ម្យ៉ាងទៀត គួរហាត់បង្កើងសាច់ដុំជើង ឲ្យតឹង ហើយបន្តរមកវិញ។
4. ពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ ក្រែងលោលោកអ្នក ត្រូវថ្នាំលេប កុំឲ្យមានឈាមកក (anticoagulant) ដើម្បីការពារ កុំឲ្យមានឈាមកកក្នុងសរសៃ។ ជាទីបញ្ចប់
5. ឧស្សាហ៍ហាត់ប្រាណ, ដើម្បីរក្សាទម្ងន់កុំឲ្យធាត់ហួសកំរិត, ហើយកុំទទួលទានបារី

មជ្ឈមណ្ឌលការពារនិងបង្ក្រាបជម្ងឺនៃសហរដ្ឋ, U.S. Center for Disease Control and Prevention ឬ CDC បានធ្វើការសិក្សាជាច្រើន ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អំពីការកកឈាមក្នុងសរសៃ, Deep Vein Thrombosis ឬ DVT ដែលជាបញ្ហាអាចមានតពូជ នៅពេលមានផ្ទៃពោះ។

ជាបន្ថែម មជ្ឈមណ្ឌល CDC បានផ្តល់ជំនួយថវិការ ទៅឲ្យអង្គការណ៍ ជាច្រើនដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាឈាមកកនៅតាមសរសៃ ដើម្បីឲ្យអង្គការណ៍ទាំងនោះមានលទ្ធភាព ធ្វើការអប់រំទៅប្រជាជន ឲ្យបានជ្រាបច្បាស់អំពីបញ្ហាឈាមប្រភេទនេះ។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីអំពីបញ្ហាឈាមកកក្នុងសរសៃ, Deep Vein Thrombosis ឬ DVT សូមមេត្តាអានរ៉ូបសែររបស់មជ្ឈមណ្ឌលការពារនិងបង្ក្រាបជម្ងឺ នៃសហរដ្ឋ, ទទួលបានបន្តកម្រិតខាងក្រោមកើតពុំគ្រប់លក្ខណៈនិងភាពពិការ ដោយសារលូតលាស់ពុំបានល្អ, Center for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defect and Developmental Disability ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.cdc.gov/ncbddd/dvt ។

Source: U.S. Center for Disease Control and Prevention, www.cdc.gov/feature/thrombosis